

## แบบฟอร์มการติดตามผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับยา Paxlovid สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเกิดอาการรุนแรงโรงพยาบาลอุดรดิตถ์

☐ ผู้ป่วย IPD WARD..... ☐ ผู้ป่วย Home Isolation ☐ ผู้ป่วย OPD  
 ชื่อผู้ป่วย..... HN:..... ID ☐-☐☐☐-☐☐☐☐-☐☐  
 Detected Date..... วันที่ขอยา..... วันที่ได้รับยา.....  
 อายุ..... น้ำหนัก..... ส่วนสูง..... BMI.....

## ประวัติก่อนรักษา

1. วินิจฉัยโควิด จาก ☐ ATK ☐ RTPCR  
 2. มีอาการไม่เกิน 5 วัน ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่  
 3. การรักษา ด้วย ออกซิเจน ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 18/5/65  
 Paxlovid ให้ได้ในผู้ป่วยปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ ไม่ตั้งครรภ์/ ให้นมบุตร และไม่ใช้ยาที่มี Drug Interaction

เกณฑ์การใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 (ต้องกรอกรายละเอียดครบทุกข้อ)		
1	มีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้	
1.1	อายุ $\geq 60$ ปี	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.2	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) (GOLD grade 2 ขึ้นไป) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.3	โรคไตเรื้อรัง (CKD) (stage 3 ขึ้นไป)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.4	โรคหัวใจและหลอดเลือด (NYHA functional class 2 ขึ้นไป) รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.5	โรคหลอดเลือดสมอง	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.6	เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.7	ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI $\geq 30$ กก./ตร.ม.)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.8	ตับแข็ง (Child-Pugh class B)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.9	ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (เป็นโรคที่อยู่ในระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด ยากดภูมิหรือ corticosteroid ( $\approx$ prednisolone 15 มก./วัน $\geq 15$ วัน)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
1.10	ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มี CD <sub>4</sub> cell count 200 เซลล์/ลบ.มม. ลงมา	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2	ประวัติการได้รับวัคซีน	
	ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีน < 3 เข็ม	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3	ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้	
	สตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตร	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4	ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ได้รับยาที่ metabolite ผ่านเอนไซม์ CYP450 3A4 ต่อไปนี้	
4.1	Alpha1-adrenoreceptor antagonist: alfuzosin	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.2	Analgesics: pethidine, propoxyphene	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.3	Antianginal: ranolazine	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.4	Antiarrhythmic: amiodarone, dronedarone, flecainide, propafenone, quinidine	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.5	Anti-gout: colchicine	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.6	Antipsychotics: lurasidone, pimozide, clozapine	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.7	Ergot derivatives: dihydroergotamine, ergotamine, methylergonovine	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.8	HMG-CoA reductase inhibitors: lovastatin, simvastatin	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.9	PDE5 inhibitor: sildenafil (Revatio <sup>®</sup> ) when used for pulmonary arterial hypertension (PAH)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4.10	Sedative / hypnotics: triazolam, oral midazolam	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

## ผลการรักษา (ที่ 10 วันหลังได้รับยา)

- ☐ ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด-19 (Recovered)  
☐ ผู้ป่วยอาการมากขึ้นต้องเข้า โรงพยาบาล/ต้องเพิ่ม oxygen / หรือย้ายเข้าหอผู้ป่วยหนัก  
☐ ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (Death)  
☐ อื่น ๆ (Other) โปรดระบุ.....

## อาการอื่นของผู้ป่วยหลังการใช้ยา Paxlovid

- ☐ ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Paxlovid (no adverse event)  
☐ มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Paxlovid โปรดระบุ.....

หมายเหตุ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญหรือผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบ (pneumonia) เล็กน้อยถึงปานกลาง ยังไม่ต้องให้ oxygen

เกณฑ์การใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 พิจารณาให้ในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ อายุ ปัจจัยเสี่ยง ประวัติการได้รับวัคซีน ข้อห้ามการใช้ยา และ Drug interaction  
 ถ้าครบทุก ประเด็นพิจารณาให้ยา Paxlovid ภายใน 5 วันภายหลังเริ่มมีอาการ ทั้งนี้การตัดสินใจในการรักษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ  
 ของแพทย์ ขนาดที่ใช้ : รับประทานยา Nirmatrelvir (ขนาด 150 มิลลิกรัม) จำนวน 2 เม็ด ร่วมกับยา Ritonavir (ขนาด 100 มิลลิกรัม)  
 จำนวน 1 เม็ด โดยรับประทานทุก 12 ชั่วโมง (วันละ 2 ครั้ง) เป็นเวลา 5 วัน รวมจำนวน Nirmatrelvir 20 เม็ด และ Ritonavir 10 เม็ด

แพทย์ผู้ส่งยา.....แพทย์ผู้อนุมัติ.....เภสัชกรผู้จ่ายยา.....วันที่.....