

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย.....อายุ..... ปี HN.....AN.....สิทธิ.....วันที่เข้ารับการรักษา.....  
 แพทย์ ( ) ไม่แพ้ ( ) แพทย์ โปรตีน.....ห้องตรวจ/หอผู้ป่วย.....โทร.....

ส่วนที่ 2 ยาที่สั่งใช้

- 2.1 ยารูปแบบรับประทานที่สั่งใช้ ☐ Fucidin (250 mg/tab) ☐ Sitafloracin 50 mg Tablet (Gracevit®)  
 ขนาดที่สั่งใช้.....ขนาด.....จำนวน.....เม็ด ( R4 7-14 วัน )  
 2.2 ยา Restricted Antibiotic inj. ที่สั่งใช้ ☐ Ertapenem (Invanz® 1 g/vial) ☐ Tigecycline (Tygacil® 50 mg/vial)  
 ขนาดที่สั่งใช้.....ขนาด.....( R4 7-14 วัน )

ส่วนที่ 3 เหตุผลประกอบการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ควบคุมการใช้

☐ Fucidin (250 mg/tab) เงื่อนไขการสั่งใช้ กรณีติดเชื้อ MRSA เท่านั้น

เหตุผลประกอบการสั่งใช้

- ( ) ผล C/S ขึ้นเชื้อ MRSA ควรแนบผล C/S เชื้อ  
 ( ) มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ MRSA และใช้ยาอื่นไม่ได้ผล โปรตีน.....  
 ( ) อื่นๆ โปรตีน.....

หมายเหตุ ในการรักษา MRSA ไม่ควรใช้ FUCIDIN® monotherapy (500 mg TID) ควรใช้ยาร่วมกับ other anti-staphylococcal antibiotics

☐ Sitafloracin 50 mg Tablet (Gracevit®) : เงื่อนไขการสั่งใช้ แพทย์ ID only และต้องแนบผลเพาะเชื้อ

เหตุผลประกอบการสั่งใช้

- ( ) Switch therapy จากยาฉีดในการรักษาภาวะติดเชื้อ MDR organisms ที่ไวต่อ Carbapenems  
 ( ) Combination therapy รักษาภาวะติดเชื้อ MDR *A. baumannii*

หมายเหตุ ขนาดยาทั่วไป 50 mg bid pc ( หากผู้ป่วยตอบสนองไม่ดีต่อขนาดยาปกติ อาจเพิ่มขนาดเป็น 100 มก. วันละ 2 ครั้ง ) นาน 7-14 วัน ปรับขนาดยาในผู้ป่วยไต  $30 \leq \text{ClCr} < 50 \text{ ml/min}$  50 mg OD,  $10 \leq \text{ClCr} < 30 \text{ ml/min}$  50 mg q 48 hr

☐ Ertapenem (Invanz® 1 g/vial) เงื่อนไขการสั่งใช้ MDR ที่ sense ต่อ ertapenem และต้องแนบผล C/S

เหตุผลประกอบการสั่งใช้

- ( ) Sepsis ใช้กรณี Document therapy ที่มีผล H/C: MDR ที่ sense ต่อ ertapenem  
 ( ) Document therapy ที่มีผล C/S MDR ที่ sense ต่อ ertapenem  
 ( ) อื่นๆ โปรตีน.....

หมายเหตุ ขนาดทั่วไป 1 g q 24 hr ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มี  $\text{ClCr} \leq 30 \text{ ml/min}$ : 0.5 g q 24 hr

และกรณี Hemodialysis ให้ขนาด 0.5 g q 24 hr ถ้าได้ยา Ertapenem ก่อน H/D < 6 hr ให้ Ertapenem 150 mg หลัง H/D

☐ Tigecycline (Tygacil® 50 mg/vial) เงื่อนไขการสั่งใช้ ต้องแนบผล C/S และเชื้อไม่ไวต่อยาด้านจุลชีพอื่น

เหตุผลประกอบการสั่งใช้

- ( ) Document therapy MDR *A. baumannii*  
 ( ) Document therapy MRSA, DRSP, VRE (ห้ามใช้เดี่ยวกรณี Nosocomial infection และมีอาการ Sepsis เนื่องจากยาไม่ครอบคลุมเชื้อ ในการรักษา *P. aeruginosa*)  
 ( ) อื่นๆ โปรตีน.....

หมายเหตุ กรณีเชื้อดื้อยา หรือติดเชื้อ *P. aeruginosa* ควรใช้ Tigecycline (100 mg then 50 mg IV q 12 hr) แบบ combination กับยา Antipseudomonal antimicrobial agents อื่นๆ

♥ Fucidin : เซ็นอนุมัติถึงแพทย์ staff

♥ Ertapenem, Sitafloracin, Tigecycline:

เซ็นอนุมัติถึงแพทย์หัวหน้ากลุ่มงาน ขอความร่วมมือแนบผลเพาะเชื้อ พ

ร้อมใบ R4 ทุกครั้งที่ยื่นขอ

ลงชื่อ.....(แพทย์ผู้สั่งใช้ยา) วันที่ .....

ลงชื่อ.....(แพทย์Staff/ID)วันที่.....

ลงชื่อ.....(แพทย์หัวหน้ากลุ่มงาน) วันที่ .....