

ค่าแนวโน้มในการรับยาเม็ดซีโลดา

- รับประทานยาเม็ดซีโลดา วันละ 2 เวลา เช้าและเย็น (ควรห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมง)
ยาเม็ดซีโลดา 500 มิลลิกรัม เช้า.....เม็ด เช้า.....เม็ด
ยาเม็ดซีโลดา 150 มิลลิกรัม (กามี) เช้า.....เม็ด เช้า.....เม็ด
- รับประทานโดยการกลืนยาพร้อมน้ำเปล่าภายใน 30 นาที หลังรับประทานอาหาร ไม่ควรหัก บด หรือเคี้ยวเม็ดยา
- รับประทานยาบานสูตรต่อวันเป็นเวลา 14 วัน และหยุดยาเป็นเวลา 7 วัน
- เมื่อสิ้นการยาให้รับประทานกับก็ที่บีบได้ แต่ก้าวลงเล็กไปบางกว่า 6 ชั่วโมง ให้คงยาตามขนาดปกติในมือกัดไปไม่ควรกินเพิ่มเป็น 2 เท่า และแจ้งให้แพทย์รับทราบเมื่อพับแพก
- ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยา คือ อาการอักเสบของพิวรีทีนฟันมือ ฟันเท้า อาการท้องเสีย และอาการเจ็บปากเจ็บคอ
- เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการอักเสบของพิวรีทีนฟันมือ ฟันเท้า (มีพื้นแดง พิวรีทีนขึ้น บวม แดง หรือลอก)
 - ใช้โกลชิบเข้มข้นหรือครีมกามีอ กามีอและเท้าเบาๆ และบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
 - หลีกเลี่ยงการเสียดสี หรือการทำงานที่ต้องใช้แรงกดของฟันมือหรือฟันเท้า ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจสวมถุงมือและกุญแจมุ่งๆ เพื่อป้องกันการเสียดสี
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่วมกัน
 - หลีกเลี่ยงแสงแดด อาจป้องกันโดยการใช้ครีมกันแดด
 - ประคบรดูดกุญแจเย็บ หรือแร่มือและเท้าไปบ้าเย็บ ยกเว้นใบกรณีที่มีความไวเกินต่อความเย็บ จากยาออกซอลิกาทิกที่หัวร่วมด้วยภายใน 3 วันแรกหลังจากได้รับยา



7. เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการท้องเสีย

- ดื่มน้ำเปล่าแร่ เมื่อเกิดอาการท้องเสีย
- หลีกเลี่ยง พัก ผลไม้สด หรืออาหารที่ไม่ได้ปรุงให้สุก
- รับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก - งดดื่มน้ำ นมปรุงร้อน และโยเกิร์ต

ถ้ามีอาการท้องเสียมากกว่า 4 ครั้งต่อวัน หรือมีอาการท้องเสียร่วมกับอาการปวด หรือเจ็บๆ คันๆ คล้ายถูกขีดตัว ให้หยุดยาและรับมาพับแพก หรือแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อปรับลดขนาดยา



8. เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บปาก เจ็บคอ (ปวดบวมแดงของปาก และคอ)

- ดื่มน้ำสะอาดมากกว่า 2 ถ้วยต่อวัน
- ทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้แปรงสีฟันบุ่นๆ
- อมกลิ้งคอตัวยับบ้าเกลือวันละ 4 เวลา (โดยเตรียมพรมเกลือครึ่งช้อนชา - 1 ช้อนชา ต่อบ้าหบ់กែវ)

ถ้ามีอาการเจ็บปาก เจ็บคอ ให้หยุดยาและรับมาพับแพก หรือแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อปรับลดขนาดยา

9. ถ้ามีอาการอาเจียนมากกว่า 1 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง ให้หยุดยาและรับมาพับแพก หรือแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อปรับลดขนาดยา

10. เพื่อป้องกันอาการไข้จากการติดเชื้อ

- ล้างมือบ่อยๆ
- หลีกเลี่ยงสกปรกที่แพร่ตัว เช่น บุหรี่
- หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ได้ปรุงให้สุก

ถ้าไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ให้หยุดยาและรับมาพับแพก

11. ยาเป็นยาเคมีบำบัด ท้าน้ำยาเป็นตัวชี้วัดรับประทาน เมื่อยับยาอีกประทานแล้ว กรุณาล้างมือให้สะอาด

12. เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการรักษา ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และไม่ควรหยุดยา หรือปรับลดขนาดยาเอง

13. ควรเก็บเม็ดยาไว้ในแพลงฯ ใบกําแพลงฯ และเย็บ กําอนหกมิตรกว่า 30 องศาเซลเซียส

หากสงสัยหรือมีอาการอื่นๆ ให้ปรึกษาหรือสอบถามแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร
ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน.....

เบอร์ที่จะติดต่อ.....