

ประเด็นคำถาม เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด-19

รวบรวมโดย งานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ชลบุรี ณ 12 พ.ค.2564

สอบถามเพิ่มเติมโทร 1507, 1508 ในวันและเวลาราชการ

คำadam	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	อ้างอิง
มีโรคประจำตัว/ยาที่ใช้			
โรคหัวใจและหลอดเลือด	มีดีได้		www.thainapci.org
โรคหลอดเลือดสมอง	มีดีได้ ยกเว้นผู้ป่วยที่อาการยังไม่คงที่หรือยังมีอาการที่อันตรายต่อชีวิต		
On warfarin	มีดีได้ (INR < 3.0)	ควรใช้เข็มขนาดเล็กกว่า 23G และไม่ควรคลึงกล้ามเนื้อหลังฉีดวัคซีน และควรกดด้ามแหงที่ฉีดหลังการฉีดยานานกว่าปกติจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีเลือดออกผิดปกติ	
On ASA, clopidogrel, cilostazol	มีดีได้ ไม่ต้องหยุดยา		
On NOACs	มีดีได้ ไม่ต้องหยุดยา		
Methotrexate	ให้หยุดยา methotrexate 1 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้งแล้วจึงให้ยาต่อตามปกติ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการคงที่) ***ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา ก่อนเสมอ***	** ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนชนิดไวรัสເວເຕັບແຕ່ຮະເລືອກໃຫ້ວັດຊົນ ชนิดເຂົ້າຕາຍ ชนิด mRNA หรือชนิด ส່ວນປະກອບຂອງໂປຣດິນ**	แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท
Steroid	- ยา prednisolone ที่น้อยกว่า 20 mg/day หรือเทียบเท่า สามารถให้การฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องหยุดยา - สำหรับยา prednisolone ที่มากกว่า 20 mg/day หรือเทียบเท่า ในผู้ป่วยที่อาการคงที่และอยู่ในช่วงที่กำลังลดปริมาณ steroid สามารถให้การฉีดวัคซีนได้เช่นกัน	** ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนชนิดไวรัสເວເຕັບແຕ່ຮະເລືອກໃຫ້ວັດຊົນ ชนิดເຂົ້າຕາຍ ชนิด mRNA หรือชนิด ส່ວນປະກອບຂອງໂປຣດິນ**	
ยากดภูมิคุ้มกัน azathioprine, mycophenolate, IVIG, cyclophosphamide ชนิดกิน	สามารถให้การฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องหยุดยา	** ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนชนิดไวรัสເວເຕັບແຕ່ຮະເລືອກໃຫ້ວັດຊົນ ชนิดເຂົ້າຕາຍ ชนิด mRNA หรือชนิด ส່ວນປະກອບຂອງໂປຣດິນ**	
โรคลมชัก	มีดีได้		
ไทรอยด์	มีดีได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคไทรอยด์แบบไดเก็ตตัม ไดแท่ มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ คอพอก ไทรอยด์เป็นพิษหรือมีออร์โนนในไทรอยด์ต่ำ		Website: สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย http://www.thaiendocrin.e.org/th/ 2021/05/05/covid-19
โรคปอดอุดกั้น, โรคหอบหืด	มีดีได้		www.thainapci.org

คำถาน	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	อ้างอิง
โรคมะเร็ง	<ul style="list-style-type: none"> - อีดได้ ยกเว้นผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับการเฝ้าดูหรือกำลังได้รับยาเคมีบำบัดควรปรึกษาแพทย์ก่อน - ผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือด โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก ควรฉีดหลังจากรักษาครบ 3 เดือน และควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา ก่อนทุกครั้ง 		มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
โรคเอตส์	อีดได้		Expert opinion, CBH
วัณโรค	อีดได้		Expert opinion, CBH
การรับวัคซีนอื่น ให้หัวดใหญ่ คอตับ ไอกรน นาดทะยักษ์ พิษสุนัขบ้า หัด- หัดเยอรมัน	แนะนำให้อีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน	*วัคซีนที่มีความจำเป็น เช่น เมือถูกสัตว์กัดให้อีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้เลือดไม่ได้จำเป็นต้องห่างช่วงเวลา เนื่องจากความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้ามีความสำคัญกว่า*	กรมควบคุมโรค
การบริจาคเลือด	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีได้รับวัคซีนชนิด mRNA หรือวัคซีนชนิดเข็อตาย อาจเว้นระยะประมาณ 1 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนก่อนบริจาคเลือด - หากได้รับวัคซีนชนิด live virus vaccine ควรเว้นระยะ 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนก่อนบริจาคเลือด 		https://www.redcross.or.th/news/information/13082
ภาวะอื่น			
กำลังให้นมบุตร	อีดได้		กรมอนามัย
กำลังตั้งครรภ์	ยังไม่มีการแนะนำให้อีดในหญิงตั้งครรภ์ เว้นแต่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง และประเมินแล้วว่าวัคซีนให้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง **ในหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ต่อภาวะรุนแรงจากโควิด รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะติดโควิด แนะนำให้อีดเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ และแนะนำให้อีดวัคซีนชนิดเข็อตาย**		
กำลังมีประจำเดือน	ไม่ได้มีข้อห้าม แต่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรหลีกเลี่ยงการอีดในช่วงมีประจำเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียง		Expert opinion, RY
เคยติดโควิดแล้ว สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่	ควรฉีดหลังจากติดเชื้ออย่างน้อย 3-6 เดือน และอาจฉีดเพียง 1 เข็ม		กรมควบคุมโรค

คำadam	คำตอบ	คำแนะนำเพิ่มเติม	อ้างอิง
ความเสี่ยง/ผลข้างเคียงที่อาจพบได้หลังจากการฉีดวัคซีน			
ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด มีไข้ อ่อนเพลีย ง่วงนอน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยล้าด้วย ฝืน	สามารถใช้วัคซีนชนิดเดิมเข้าได้		www.thainapci.org
Anaphylaxis อาการแพ้ เอียบพลัน โดยมีอาการ 2 ใน 4 ของทางระบบผิวน้ำหนัง/ ทางเดินหายใจ/มีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต/ทางเดินอาหาร	ห้ามให้วัคซีนชนิดเดิมอีก แนะนำให้เปลี่ยนชนิดของวัคซีน		www.thainapci.org
คำ adam อื่น ๆ			
สามารถฉีดวัคซีนโควิดสับ ชนิดได้หรือไม่	ขณะนี้ยังไม่มีผลการศึกษา จึงแนะนำให้ฉีดชนิดเดียวกัน		กรมควบคุมโรค
หากเคยฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังต้องมีการฉีดวัคซีน ขั้นหรือไม่	ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลวัคซีนโควิด 19 ต่อระดับภูมิคุ้มกันโรคในระยะยาว จึงยังไม่มีคำแนะนำในขณะนี้		กรมควบคุมโรค
เคยมีประวัติแพ้ยา หรือ อาหารอย่างรุนแรง (anaphylaxis)	พิจารณาฉีดได้ แต่ต้องมีการติดตามอาการ ใกล้ชิด อาจเกิดอาการแพ้เอียบพลันได้	อาจพิจารณาให้ non-sedative antihistamine ก่อน	Webcast; Expert opinion
เลื่อนวันฉีดวัคซีนได้หรือไม่	Sinovac: สามารถเลื่อนนัดฉีด โดยห่างจากเข็มแรกไม่เกิน 4 สัปดาห์		กรมควบคุมโรค

รวบรวมโดย งานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ชลบุรี ณ 12 พ.ค.2564

สอบถามเพิ่มเติมโทร 1507, 1508 ในวันและเวลาราชการ