

ใบประกอบการสั่งใช้ยา Restricted Antibiotics โรงพยาบาลอุดรดิตถ์

ใบ R1/66

14 รายการ : Azithromycin, Ampicillin/sulbactam, Cefoperazone/sulbactam, Ceftazidime , Fosfomycin, Imipenem/cilastatin , Levofloxacin, Meropenem , Piperacillin/tazobactam , Vancomycin, Ertapenem*, Fucidin*, Sitafloracin*, Tigecycline* (* = ใช้ R4)

ส่วนที่ 1. ชื่อผู้ป่วย.....อายุ..... ปี HN..... AN..... สิทธิ.....
วันที่เข้ารับรักษา..... ประวัติผู้ป่วย : Antibiotic allergies WARD.....

ส่วนที่ 2. A-D

A. Check if patient has : ☐ Fever ☐ Granulocytopenia ☐ Hepatic insufficiency ☐ Renal insufficiency
☐ D.M. ☐ Other

B. Check an indication for use :

1. ☐ Surgical Prophylaxis (กรณีเลือกข้อ 1 ข้ามไปทำข้อ C.)

Procedure : ☐ Abdominal ☐ Biliary ☐ Cardiothoracic ☐ Head&Neck ☐ Neurosurgical
☐ Gyn ☐ Orthopedic ☐ Other

2. ☐ Therapy2.1 ☐ Documented therapy (ทราบตำแหน่งและเชื้อที่เป็นสาเหตุที่มีผลไวต่อยา)

เชื้อที่เป็นสาเหตุ

2.2 ☐ Empiric therapy (ไม่ทราบตำแหน่งและ/หรือเชื้อที่เป็นสาเหตุแน่นอน) ต้องระบุ 2.1.1-2.1.3☐ Check for investigation

2.2.1 Gram stain done : ☐ Yes ☐ No

2.2.2 Culture ordered : ☐ Blood ☐ Urine ☐ Sputum ☐ CSF ☐ Wound

☐ อื่นๆ

2.1.3 Septicemia : ☐ Not suspected ☐ Suspected ☐ Documented

C. การคำนวณค่า creatinine clearance (ml/min) = $\frac{(140 - \text{อายุเป็นปี}) \times \text{น้ำหนัก (ก.ก.)}}{72 \times \text{serum creatinine}}$ X 0.85 (ในผู้หญิง)
= ml/min

(**กรุณารอกข้อมูล CICrขนาดยา restricted antibiotics ที่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยได้ แสดงรายละเอียดด้านหลัง)

D. เริ่มสั่งใช้ ว / ด / ป

ยา ขนาด ทุก ชม. จำนวนที่คาดว่าจะใช้ วัน

แพทย์ผู้สั่งใช้ Intern/Staff (นพ./ พญ.)

กรณี empiric therapy
จะหยุดจ่ายยาหลังผู้ป่วย
ได้รับยาวันแรก 4 วัน

() กรณี Documented therapy และแนบผลเพาะเชื้อ จ่ายยาเป็น continue 7 วัน

Day 1-7 วันที่.....ถึง.....

แพทย์ผู้สั่งใช้ Intern/ STAFF (นพ./ พญ.)

หมายเหตุ

❖ กรณี Documented therapy ต้องระบุ 2.1 ครบถ้วน และแนบผลเพาะเชื้อ จะจ่ายยาเป็น continue 7 วันทันที

❖ กรณี Empiric therapy ห้องจ่ายยา จะจ่ายยา Restricted antibiotics ให้ในการใช้ครั้งแรก ต่อเมื่อมีการลงรายละเอียดในใบ restricted antibiotics ครบถ้วน ในข้อ 2.2 และจะหยุดจ่ายยาหลังผู้ป่วยได้รับยาวันแรก 4 วัน